

NOTICE DU PREVISCAN

Molécule(s)	Fluindione
Classe thérapeutique	Anticoagulant oral (antivitamine K)
Laboratoire(s)	<u>Procter et Gamble pharmaceuticals</u>
Indications	PREVISCAN est utilisé comme traitement préventif et curatif des thromboses (caillots sanguins qui se forment dans les vaisseaux).
Informations pratiques	PREVISCAN est délivré seulement sur ordonnance.
Mode d'action	PREVISCAN agit en bloquant la synthèse de certains facteurs de la coagulation, dépendante de la vitamine K.
Effets secondaires	On observe rarement avec PREVISCAN, l'apparition d'hémorragies sous-cutanées, des troubles digestifs et des éruptions cutanées. Toute autre manifestation secondaire inhabituelle doit être signalée le plus tôt possible à votre médecin traitant.
Contre-indications / Précautions d'emploi	<p>PREVISCAN est contre-indiqué en présence d'hémophilie, de problèmes hémorragiques, d'ulcères gastroduodénaux, de colite ulcéreuse ou si vous êtes allergique aux anticoagulants oraux.</p> <p>Avant de prendre PREVISCAN, il convient de signaler à votre médecin si vous souffrez d'hypertension artérielle grave, insuffisances rénale ou hépatique graves. Signalez également si vous avez des règles abondantes et longues ou si vous devez subir une intervention chirurgicale (y compris dentaire) dans les 2 prochains mois.</p> <p>Consultez votre médecin traitant avant de prendre PREVISCAN en cas de grossesse ou d'allaitement (utilisation déconseillée).</p> <p>Les sujets âgés, les nourrissons et les enfants ne doivent prendre PREVISCAN que sous contrôle médical. Les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines doivent être plus particulièrement prudents s'ils prennent PREVISCAN.</p> <p>L'utilisation prolongée de PREVISCAN doit être suivie par des examens médicaux et biologiques (surveillance de la coagulation) réguliers.</p> <p>Il est déconseillé de se livrer à des activités sportives ou physiques violentes, ou entraînant un danger de coupure.</p> <p>Ne pas interrompre brutalement PREVISCAN.</p>
Interactions médicamenteuses	<p>L'association est contre-indiquée avec les médicaments contenant de la phénylbutazone, de l'aspirine ou du miconazole par voie générale (l'usage local est permis). Attention : de nombreux médicaments contenant de l'aspirine sont vendus sans ordonnance sous des noms divers.</p> <p>PREVISCAN peut interagir avec de très nombreux autres médicaments. Il est capital de signaler tout autre traitement à votre médecin.</p>

Surdosage

Le surdosage peut se manifester par : hémorragie digestive (selles noirâtres, vomissements de sang), toux sanglante, urines rouges, hématomes sous-cutanés. En cas de doute, contactez immédiatement le centre antipoison le plus proche.